

Boletín educativo para el paciente

Procedimientos/Pruebas de Diagnóstico – Ala 3SWN

Cuidado después de una Broncoscopía

1. No es inusual que se tenga fiebre la noche después de la broncoscopía. Si la fiebre se eleva a más de 101 grados Fahrenheit, tome acetaminofén (por ejemplo Tylenol) como le indicó el Médico del NIH ó la Enfermero/a Especializado/a. Si la fiebre dura más de 24 horas, póngase en contacto con su médico de cabecera.
2. Puede sentir dolor de garganta. Utilice caramelos mentolados si lo necesita.
3. Debe toser y respirar profundamente durante las próximas 24 horas.
4. Puede ser que sienta que su garganta está adormecida por varias horas después de la broncoscopía, debido a los medicamentos utilizados durante la intervención. No beba ni coma nada hasta que vuelva el reflejo nauseoso. Puede ser que pasen varias horas y la enfermera pondrá a prueba su reflejo nauseoso (el tragar), antes de proveerle algo para beber.
5. **Vuelva** a sus actividades regulares poco a poco. Se le administraron sedantes durante la intervención que pueden hacerlo/a sentir cansado/a ó mareado/a.
6. **Reinicie** su dieta regular y todos sus medicamentos, a menos que su médico le haya indicado lo contrario. Su médico le dará instrucciones específicas con respecto a cuándo reiniciar sus medicamentos anti-inflamatorios ó anti-coagulantes.
7. **No conduzca un automóvil ni opere maquinaria** pesada por un mínimo de 24 horas después de la intervención. Los sedantes pueden interferir con su habilidad de concentrarse ó de reaccionar rápidamente, por lo tanto sería peligroso.
8. **No beba bebidas alcohólicas por 24 horas.** La combinación de alcohol y sedantes puede afectar su cuerpo de tal manera que podría ser de peligro para su salud.
9. **No tome decisiones importantes,** no firme contratos ó documentos legales durante las próximas 24 horas. Es posible que no pueda pensar claramente debido a los sedantes.

Si usted siente alguno de los siguientes síntomas, ó alguno de estos síntomas empeora, por favor vaya a la sala de emergencia más cercana a usted:

- Dificultad para respirar.
- Dolor de pecho ó incomodidad
- Dolor de garganta severo ó hinchazón del cuello.
- Mareo severo, debilidad ó aceleración del ritmo cardíaco.
- Sangre de nariz (más de una cucharadita)
- Tos con sangre (más de una cucharadita)

Por favor recuerde que el personal está aquí para ayudarle. Si tuviera preguntas ó inquietudes con respecto a esta intervención, por favor llame a la operadora de localizador al **(301) 496-1211** y pida que se le comunique con el equipo encargado de su cuidado.

Esta información ha sido preparada específicamente para los pacientes que participan en protocolos de investigación clínica en el Centro Clínico de los Institutos Nacionales de la Salud, y podría no ser pertinente para pacientes de otros lugares. Si tiene alguna pregunta sobre la información presentada aquí, hable con un miembro de su equipo de atención médica.

La mención de nombres de productos o recursos se hace solamente para dar ejemplos, y no implica la promoción de los mismos por parte de los NIH. El hecho de que no se mencione el nombre de un producto o recurso no implica que este no sea

National Institutes of Health
Clinical Center Bethesda, MD 20892

¿Tiene preguntas sobre el Centro Clínico?

<http://www.cc.nih.gov/comments.shtml>

Revised 10/11

